Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald
Gesundheitsamt
Sautierstr. 28/30, 79104 Freiburg

Info zur Wiederzulassung nach Infektionskrankheiten

(angelehnt an die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts: www.rki.de Startseite>Infektionsschutz>RKI-Ratgeber/Merkblätter)

Erkrankung	Übertragung	Inkubation	Symptome	Ansteckungs-fähigkeit	WZ nach Erkrankung	WZ von Kontaktpersonen	WZ Ausscheider	Ärztl. Attest
ENTERITIS								
a.)Salmonellen b.)Campylo-bacter c.)Yersinien	Kontaminierte Nahrungsmittel, Schmierinfektion	a.)5 - 72 Std. b.)2 - 7 Tage c.)7 - 10 Tage	Fieber, Durchfall, Erbrechen, Bauchschmerzen	Solange Erreger im Stuhl ausgeschieden werden	Vorschulalter: nach Abklingen der Symptome: kein Durchfall geformter Stuhl	Sofort, wenn keine klinischen Krankheitszeichen vorliegen		Nicht erforder-lich
d.)Shigellen	Schmierinfektion	d.)12 - 96 Std.	Fieber, Durchfall, Bauchschmerzen, blutige Stühle	Solange Erreger im Stuhl ausgeschieden werden	Klinisch gesund und 3 neg. Stuhlbefunde	Klinisch gesund + 1 neg. Befund am Ende der Inkubationszeit	3 neg. Stuhlproben oder Rücksprache mit dem GA	**Erforderlich**
e.)EHEC	Kontaminierte Nahrungsmittel, Schmierinfektion	e.)1 - 10 Tage	Fieber, Durchfall, Erbrechen, s. gefährlich f. Kleinkinder	Solange EHEC-Bakterien im Stuhl nachgewiesen werden	Wenn klinisch gesund und 3 neg. Stuhlbefunde	Sofort, wenn keine Sympt. vorliegen; Händehygiene u. Umgebungsuntersu chung 3Stuhlproben	Nach 3 neg. Stuhlproben o. Rü. mit dem GA	**Erforderlich**
f.)Rotavirus	Schmierinfektion	f.)1 - 3 Tage (5 - 8 Tage Adenoviren)	Durchfall, Erbrechen, häufig im 1. - 2. Lebensjahr	Solange Erreger im Stuhl ausgeschieden werden	Zwei Tage nach Abklingen der Symptome	Sofort, Händehygiene beachten	Sofort, Achtung Händehygiene	Nicht erforder-lich
g.)Norovirus	Schmierinfektion, Virushaltige Tröpfchen beim Erbrechen	g.)6 - 50 Std.	Durchfall, Erbrechen, Bauchschmerzen. Symptome klingen meist schnell wieder ab (12 - 48 Std)	Solange Erreger im Stuhl ausgeschieden werden (min. zwei Tage nach Abklingen der Symptome)	Zwei Tage nach Abklingen der Symptome	Sofort, Händehygiene beachten	Sofort, Achtung Händehygiene	Nicht erforder-lich
h.)Typhus/ Paratyphus	Meist kontaminier-te Lebensmittel, selten Schmier-infektion	Typhus: 8 - 14 Tage (3 - 60 Tage) Paratyphus: 1 - 10 Tage	Kopf-/Glieder-schmerzen, Fieber, Bauchschmerzen, erst evtl. Verstopfung, später oft Durchfälle	Ab etwa einer Woche nach Krankheits-beginn solange Erreger im Stuhl nachweisbar sind.	Klinisch gesund und 3 negative Stuhlproben	Klinisch gesund und 3 negative Stuhlproben	Rücksprache mit dem GA	**Erforderlich**
i.)Cholera	Schmierinfektion, kontaminierte Nahrungsmittel	i.)einige Stunden bis 5 Tage	Wässrige Durchfälle, Erbrechen, Bauchschmerzen	Solange Erreger im Stuhl nachweisbar sind	Klinisch gesund und 3 negative Stuhlproben	Klinisch gesund und 1 negative Stuhlprobe	Rücksprache mit dem GA	**Erforderlich**

Erkrankung	Übertragung	Inkubation	Symptome	Ansteckungs-fähigkeit	WZ nach Erkrankung	WZ von Kontaktpersonen	WZ Ausscheider	Ärztl. Attest
DIPHTHERIE	Tröpfcheninfektion	2 - 5 Tage (8 Tage)	Fieber, Katarrh, Erstickungsanfälle durch Kehlkopfbeläge	Solange RA pos. oder 4 Tage nach Beginn der ATB	Abklingen der Symptome u. 3 neg. RA	Ohne ATB: nach 3 neg. RA/ mit ATB: am 3. Tag nach Beginn der Behandlung	Nur nach 3 neg. RA und Rü. mit dem GA	**Erforderlich**
HAND-FUß-MUND-KRANKHEIT	Tröpfcheninfektion Kontakt mit den Bläschen Schmierinfektion (Hände)	3-10 Tage (1-30 Tage)	Fieber, Halsschmerzen, Ausschlag, Bläschen	1 Woche ab Beginn des Ausschlags, danach abnehmend Verlauf oft asymptomatisch	Bläschen abgetrocknet, klinisch gesund	Sofort Händehygiene beachten		Nicht erforderlich
HEPATITIS - A	Schmierinfektion	15 - 50 Tage (25 - 30 Tage)	Fieber, Schnupfen, Bauchschmerzen, Ikterus	1 – 2 Wo. vor u. 1 Wo. nach Auftreten des Ikterus	2 Wo. nach den ersten Sympt. bzw. 1 Wo. nach Ikterus, wenn klinisch gesund	Sofort, wenn geimpft oder Krankheit durchgemacht/ 1 - 2 Wo. nach postexpositioneller Impfung und Rü. mit dem GA/ 4 Wo. nach Kontakt, falls keine Impfung		Nicht erforder-lich
HEPATITIS - B	Blut, Körpersekrete, Speichel	60 - 90 Tage (40 - 200 Tg.)	Magen-Darm-Beschwerden, Fieber, Gelenkschmerzen, Ikterus	Solange serologisch pos. (HBeAg, HBsAg, HBV-DNA)	Klinisch gesund	Sofort	Achtung! Virus-Träger Rü. mit GA	Nicht erforder-lich
HEPATITIS - C	Blut, Körperflüssig-keiten	6 - 9 Wo. (2-24 Wochen)	Initial meist ohne oder nur mit unspezifischen Symptomen	Solange Hep.C-Virus nachgewiesen wird	Klinisch gesund	Sofort		Nicht erforder-lich
KEUCH-HUSTEN	Tröpfcheninfektion	7 - 20 Tage	Katarrh, Fieber, Krampfhusten	1 - 2 Wo. vor Beginn des Krampfhustens, dann abnehmend	Ohne ATB 3 Wo. nach Beginn der Krankheit, mit ATB 5 Tage nach Beginn der Therapie	Sofort, solange keine Krankheits-symptome auftreten, Auffrischimpfung in Erwägung ziehen!		Nicht erforder-lich
MASERN	Tröpfcheninfektion	8 - 10 Tage (bis zu 18 Tg.)	Infekt, Katarrh, Husten, Fieber, Ausschlag	5 Tage vor bis 4 Tage nach Auftreten des Ausschlags	Nach Abklingen der Symptome, frühestens aber 5 Tage nach Auftreten des Exanthems	Sofort, wenn geimpft oder Krankheit durchgemacht/ nach postexpositio-neller Impfung und Rü. mit dem GA/ sonst nach 18 Tg		Nicht erforder-lich

Erkrankung	Übertragung	Inkubation	Symptome	Ansteckungs-fähigkeit	WZ nach Erkrankung	WZ von Kontaktpersonen	WZ Ausscheider	Ärztl. Attest
MENINGITIS (Hirnhautentzd.) a) Hib	Tröpfcheninfektion	Nicht genau bekannt. Meist wenige Tage	Fieber, Katarrh, Schluckbeschwerden; sehr gefährlich für Kleinkinder	Solange unbehand. Krankheitszeichen vorliegen u. bis 24 Std. nach Beginn der ATB	Nach Abklingen der klinischen Symptome	Sofort, wenn klinisch gesund oder Rü. mit GA, ggf. Chemoprophylaxe		Nicht erforder-lich
b) Meningo-kokken	Tröpfcheninfektion	1 - 10 Tage, meist weniger als 4 Tage	Fieber, Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit, Erbrechen u. Petechen	Solange Erreger im RA oder bis 24 Std. nach ATB Beginn		Nach Rü. mit GA sorgfältige Über-wachung u. ggf. Chemoprophylaxe		Nicht erforder-lich
MUMPS	Tröpfcheninfektion	16 - 18 Tage (12 - 25 Tage)	Fieber, Schnupfen, Schwellung der Ohrspeicheldrüse	7 Tage vor bis 9 Tage nach der Schwellung	Nach Abklingen der Symptome o. frühestens 9 Tage nach Beginn Drüsen-schwellung	Sofort, wenn geimpft oder Krankheit durchgemacht oder nach postexpositioneller Impfung, sonst nach 18 Tagen		Nicht erforder-lich
POLIO-MYELITIS	Schmierinfektion	3 - 15 Tage (- 35 Tage)	Infekt, Darmkatarrh, Lähmungen	Ab dem 2. – 3. Tag nach Infektion bis 4 Wo. (manchmal auch 5 Mon.)	Frühestens 3 Wo. nach Krankheits-beginn u. 4 neg. Stuhlproben	Rü. mit GA. Bei Impfschutz und zusätzlich 1 neg. Stuhlprobe.	Rü. mit GA	**Erforderlich**
RÖTELN	Tröpfcheninfektion	14 - 21 Tage	Katarrh., Ausschlag, Nackenlymphknoten-schwellung	7 Tage vor bis 7 Tage nach Ausbruch des Ausschlages	Rücksprache mit dem GA	Rücksprache mit dem GA		Nicht erforder-lich
RINGEL-RÖTELN	Tröpfcheninfektion und Schmierinfek-tion (Hände)	4 - 14 Tage (max. 3 Wochen)	Leichtes Fieber, kokardenförmiger Ausschlag	Bis zum Ausbruch des Ausschlages	Klinisch gesund, Kinder mit Ausschlag sind praktisch nicht mehr infektiös	sofort		Nicht erforder-lich
SCHARLACH	Tröpfcheninfektion	1 - 3 Tage	Angina, Fieber, Ausschlag	3 Wo. ohne ATB o. bis 24 Stunden nach Beginn der ATB	Klinisch gesund ab dem 2. Tag nach ATB-Beginn, sonst frühestens nach Abklingen der Symptome	Sofort, wenn klinisch gesund	Gesunde Keimträger können zugelassen werden	Nicht erforder-lich

Erkrankung	Übertragung	Inkubation	Symptome	Ansteckungs-fähigkeit	WZ nach Erkrankung	WZ von Kontaktpersonen	WZ Ausscheider	Ärztl. Attest
WINDPOCKEN	Tröpfcheninfektion u. Kontakt mit den Bläschen/Krusten	14 - 16 Tage (8 - 28 Tage)	Katarrh, Fieber, bläschenförmiger Ausschlag	2 Tage vor dem Ausbruch, 5 - 7 Tage nach Auftreten der ersten Bläschen	Klinisch gesund 1 Woche nach Beginn des Ausschlags	-Sofort, wenn 2x geimpft oder Krankheit durchgemacht -1x geimpft/nach postexpositioneller Impfung: Rü mit GA -Sonst nach 16 Tagen		Nicht erforder-lich
KOPFLÄUSE	Haar-Haar-Kontakt (Schal, Mütze, gemeins. Kämme)		Juckreiz der Kopfhaut, Nacken, hinter den Ohren	Solange ein Befall mit geschlechtsreifen Läusen besteht	Direkt nach der 1. Behandlung, 2. Behandlung nach 8 - 10 Tagen erforderlich	Sofort, wenn Inspektionsbefund der Haare neg. ist.		Nicht erforder-lich beim erst-maligen Befall
KRÄTZE	Berührungs-infektion	14 - 35 Tage Erstinfektion u. wenige Tage bei Reinfektion	Nächtl. Juckreiz, Knötchen, stark juckende Bläschen	Während des Befalls solange nicht behandelt (Durch-schnitt 8 Wochen)	Nach Behandlung (topisch oder oral)	Sofort u. ärztliche Überwachung während der Inkubationszeit		**Erforderlich**
IMPETIGO (Borkenflechte)	Schmierinfektion	2 - 10 Tage	Eitrige Hautbläschen	nach 24 Std. ATB Therapie oder alle Effloreszenzen abgeheilt	Frühestens 24 Stunden nach ATB oder nach Abheilung der Hautareale	Sofort		**Erforderlich**
Ansteckungsfäh. LUNGEN-TUBER-KULOSE	Rücksprache mit dem GA							**Erforderlich**

Abkürzungen:

ATB	=	Antibiotikatherapie
RA	=	Rachenabstrich
GA	=	Gesundheitsamt
Rü	=	Rücksprache
WZ	=	Wiederzulassung
neg	=	negativ
pos.	=	positiv

Bei Meldungen bzw. Rückfragen: **Tel.: 0761 / 2187-3428 oder 2187-3212**
Fax.: 0761 / 2187- 3299

Stand März 2018